



Influenza Aviar (AI)

Influenza Aviar (AI)

La Influenza Aviar (AI, por sus siglas en inglés) es un virus de influenza que puede causar enfermedades en pollos, pavos y aves domésticas. Las aves acuáticas migratorias son una reserva natural de esta enfermedad.

Existen muchas cepas del virus AI. Basándose en la severidad de la enfermedad que causa este virus, estas cepas se colocan en dos clasificaciones, levemente patogénicas (LPAI) y altamente patogénicas (HPAI). La mayoría de cepas del virus AI son consideradas típicamente LPAI, y causan muy poco o ningún signo clínico en las aves infectadas. Sin embargo, algunas cepas del virus son altamente patogénicas o capaces de mutar a virus HPAI en ciertas condiciones de campo. La HPAI puede ser una forma extremadamente infecciosa o mortal de la enfermedad.

Signos Clínicos

Las aves infectadas por AI pueden exhibir uno o más de estos signos:

- Muerte súbita sin signos clínicos
- Falta de energía y apetito
- Disminución de la producción de huevos
- Huevos con cáscara suave, o deformes
- Inflamación de la cabeza, párpados, cresta, carúnculas y corvejones
- Decoloración morada de las carúnculas, crestas y patas
- Descarga nasal
- Tos, estornudos
- Incoordinación
- Diarrea

Introducción & Propagación del AI

El movimiento de aves de corral, equipo y personas ha incrementado el riesgo de introducir AI a las bandadas. Las aves expuestas a las aves acuáticas migratorias también tienen mayor riesgo de contraer el virus.

Una vez la AI es introducida en una bandada, se puede esparcir por el contacto directo de ave a ave, o por transmisión mecánica por medio de estiércol, equipo, vehículos, cajas y contenedores de huevos. Los empleados y visitantes y también pueden acarrear el virus en ropa y zapatos contaminados.

En temperaturas moderadas, el virus de AI puede mantenerse viable por largos periodos de tiempo. En un ambiente congelado, el virus puede sobrevivir indefinidamente.

Medidas de Bioseguridad

Los productores de aves de corral siempre deben de ejercer buenas prácticas de bioseguridad para prevenir la introducción de la AI en sus bandadas.

- Mantenga una filosofía de “todo lo que entra, tiene que salir” en el manejo de la bandada.
- Limpie y desinfecte a fondo todo el equipo, y las llantas y armazón inferior de los vehículos que entren y salgan de la finca.
- Permita la entrada solamente de los vehículos y personal esenciales a la finca.
- Provea ropa limpia e instalaciones de desinfección para los empleados.
- Evite que las bandadas de aves de corral entren en contacto con aves silvestres o migratorias.
- Mantenga las aves de corral alejadas de cualquier fuente de agua que haya sido contaminada por aves silvestres.
- Evite visitar otras fincas de aves de corral. Si usted debe ir a un lugar en donde hay otras aves de corral, desinfecte o cambie su ropa y calzado antes de regresar a su propia finca.
- No lleve aves a su finca a menos que conozca el estado de salud de la bandada de origen.

Medidas de Bioseguridad para Mercados de Pulgas y Mercados de Aves Vivas

Para prevenir un brote de AI, los productores y vendedores de aves de corral deben practicar buenas medidas de bioseguridad en los mercados y otros lugares en lo que se venden aves vivas. El virus de influenza aviar puede ser introducido a estos lugares por medio de aves infectadas, o por cajas, camiones y equipo contaminados.

Una vez establecida, la enfermedad puede esparcirse rápidamente a medida que las aves y el equipo son transportados del punto de venta hacia las fincas u otros lugares de mercadeo.

- Para limpieza más fácil, utilice cajas de metal en lugar de cajas de plástico o madera.
- Mantenga las instalaciones, balanzas y área libres de estiércol, plumas y otros desechos que puedan albergar el virus.
- Limpie y desinfecte todo el equipo, cajas y vehículos antes de llevarlos a un sitio después de haber estado en un lugar donde se hayan vendido aves de corral.
- Mantenga las aves de corral recién adquiridas separadas de otras aves, especialmente si las aves de corral se originaron de diferentes lotes.
- Limpie y desinfecte el área de mercado cada día después que haya acabado la venta.

Reporte los Signos Sospechosos

Si sus aves exhiben muertes inusuales o signos de la enfermedad, llame inmediatamente a su veterinario privado o a la Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC) al 1-800-550-8242. Un veterinario está de turno las 24 horas del día. Un Diagnosticador de Enfermedades Animales Exóticas (FADD por sus siglas en inglés) puede ser enviado a tomar muestras para pruebas de laboratorio y para iniciar una investigación de la enfermedad.